Rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 da soggetti asintomatici

Con mascherina, contatti di breve durata

Tipologia di attività del gruppo	Ambiente non affollato			Ambiente affollato		
	All'aperto, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione inadeguata	All'aperto, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione inadeguata
In silenzio						
Parlare						
Gridare, cantare						

Con mascherina, contatti prolungati

Tipologia di attività del gruppo	Ambiente non affollato			Ambiente affollato		
	All'aperto, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione inadeguata	All'aperto, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione inadeguata
In silenzio						
Parlare		*		*		
Gridare, cantare						

* Caso borderline che dipende strettamente dalle definizioni quantitative di distanziamento, numero di persone e durata dell'esposizione.

Senza mascherina, contatti di breve durata

Tipologia di attività del gruppo	Ambiente non affollato			Ambiente affollato		
	All'aperto, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione inadeguata	All'aperto, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione inadeguata
In silenzio						
Parlare						
Gridare, cantare						

Senza mascherina, contatti prolungati

Tipologia di attività del gruppo	Ambiente non affollato			Ambiente affollato		
	All'aperto, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione inadeguata	All'aperto, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione adeguata	Al chiuso, aerazione inadeguata
In silenzio						
Parlare						
Gridare, cantare						

Rischio di trasmissione	Basso	Medio	Alto

Rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 da soggetti asintomatici in ambienti diversi e per differenti tempi di esposizione, ventilazione e livelli di affollamento (non considerando le variabilità in termini di suscettibilità individuale e di diffusione locale del virus).
Per mascherine si intendono quelle in uso alla popolazione generale (FFP2, chirurgiche, *home made*) e non quelle destinate agli operatori sanitari (FFP3, altro). I gradi sono indicativi del rischio relativo qualitativo e non rappresentano una misura quantitativa. Per valutare il rischio di trasmissione può essere necessario tenere in considerazione altri fattori non considerati, inclusa la carica virale di una persona infetta e la suscettibilità delle persone alle infezioni. Tosse o starnuti da parte di soggetti asintomatici, anche se dovuti a irritazioni o allergie, potrebbero aumentare il rischio di esposizione, indipendentemente dall'aerazione dell'ambiente.

Traduzione a cura della Fondazione GIMBE da: Jones NR et al. BMJ 2020;370:m3223